Geologischer Überblick

Untergrund – Grundlage des Lebens
 Nordrhein-Westfalen zählt aus geologischer Sicht zu den abwechslungsreichsten Regionen Deutschlands. Mehr als 500 Mio. Jahre Erdgeschichte sind hier dokumentiert – kaum ein anderes Bundesland weist eine größere Anzahl unterschiedlich alter Gesteine an der Erdoberfläche auf. Sie bergen eine Vielzahl von Fest- und Lockergesteins-Rohstoffen, aber auch Salz, Erze, Stein- und Braunkohle. Ihre Gewinnung reicht teilweise Jahrtausende zurück und hat NRW nachhaltig geprägt. Nach wie vor sind einige Rohstoffe bedeutende Standbeine unserer Wirtschaft. Eine neue Art von Rohstoff ist die Erdwärme. Ihre Erschließung steht erst in den Anfängen, sie hat aber ein großes Zukunftspotenzial. In den Gesteinsschichten sammelt sich Grundwasser, das als Trinkwasser unser wichtigstes Lebensmittel ist. Aus den Gesteinen haben sich marmorartige Böden entwickelt, die uns als Acker-, Weid- oder Waldstandorte Nahrung, regenerative Rohstoffe, Erholungsräume und auch die Luft zum Atmen schenken. Geologie und Boden prägen somit entscheidend den Natur-, Lebens- und Wirtschaftsraum NRW. Die Gesteine sind nicht nur der oft wenig beachtete Boden unter den Füßen, sondern – im wörtlichen Sinne – unsere Lebensgrundlage.

Gesteine – Archiv bewegter Erdgeschichte
 Erdgeschichte bedeutet stetige, in unseren Augen meist unendlich langsam ablaufende Veränderungen. Wo wir heute sicheren Boden unter unseren Füßen spüren, waren einstmals Meere, Flüsse, Dünen, Sümpfe, Vulkane oder Gletscher. Die aus einzelnen Platten aufgebaute Erdkruste ist ständig in Bewegung. Wo zwei Platten aufeinanderstoßen, entstehen durch die dabei wirkenden gewaltigen Kräfte Gebirge. Wo die auseinanderdriften, bilden sich Meeresbecken. Die Platten wandern im Verlauf der Erdgeschichte durch verschiedene Klimazonen. So lag NRW mit seinen heute gemäßigten Temperaturen vor Jahrmillionen viel weiter südlich, in Breiten, wo es z. B. Wüsten, Urwälder oder Korallenriffe gab.

Die Zusammensetzung der Gesteine und die in ihnen enthaltenen Spuren längst vergangener Lebens – die Fossilien – verraten dem Geowissenschaftler, welche Umweltbedingungen bei ihrer Bildung herrschten. Die Gesteine NRWs sind somit ein Archiv für die Umweltbedingungen unseres Bundeslandes während der letzten 500 Mio. Jahre. Eine Landschaft wird von der Beschaffenheit ihrer Gesteine geprägt. Wo harte, verwitterungsresistente Schichten den Untergrund aufbauen, findet man Hügel und Berge; flache Mulden und Niederungen deuten auf weiche, verwitterungsanfällige Schichten hin.

Nicht nur die Gesteine tragen zur Charakteristik einer Landschaft bei, sondern auch die gebirgsbildenden Kräfte, denen sie vor Jahrmillionen ausgesetzt waren. Unsere Mittelgebirge mit ihren gefalteten oder schräg gestellten Schichten sind dafür die besten Zeugen. Aber auch Verwitterung und Abtragung, die Gletscher der Eiszeiten sowie zahlreiche andere Prozesse wie Erdbeben und Vulkanausbrüche haben NRW sein abwechslungsreiches Erscheinungsbild gegeben.

Geologische Karte – Bild vom Untergrund
 Die geologische Karte auf der Vorderseite stellt die aus den verschiedenen Erdzeitaltern stammenden Gesteinseinheiten dar, die man an der Erdoberfläche findet. Dünne Lockergesteinsdecken sind dabei nicht berücksichtigt. Die einzelnen Farben der Karte stehen im Wesentlichen für das Alter, zum Teil auch für die Entstehungsbedingungen und die Beschaffenheit der Schichten.

Die vorherrschenden Sand-, Schluff-, Ton- und Kalksteine sind die Relikte eines Meeresbeckens, das große Gebiete Norddeutschlands und Polens einnahm. NRW lag zu jener Zeit in Äquatornähe. Davon zeugen die im Rheinischen Schiefergebirge weitverbreiteten Rifflitkiese.

Vor rund 300 Mio. Jahren – im Zuge der sogenannten variszischen Gebirgsbildung – stießen zwei Kontinentalplatten zusammen und bildeten den Superkontinent Pangäa. In dem fast die gesamte kontinentale Erdkruste in einer einzigen Landmasse vereint war. In einer ca. 1.000 km breiten Zone, die von Nordamerika bis zum Schwarzen Meer reichte, wurden die ursprünglich horizontal abgelagerten Gesteine zusammengeschnürt, verformt, zum Variszischen Gebirge aufgefaltet und herausgehoben. Für das Rheinische Schiefergebirge, ein Teilgebiet des Variszischen Gebirges, begann schon vor rund 290 Mio. Jahren, im Perm, die Abtragung zu einem flachen Hochgebiet. Es blieb weitgehend frei von jüngeren Ablagerungen und wurde nur randlich vom Meer überflutet. Seinen heutigen Mittelgebirgscharakter erhielt es erst in den letzten 5 Mio. Jahren, als es erneut durch Erdkrustenbewegungen herausgehoben wurde.

se, in der NRW sein Erscheinungsbild häufig geändert hat. So sind die damals entstandenen Gesteine Zeugnisse von Meeren, Lagunen, Flüssen, Seen und Wüsten. Die Gebirgszüge dieses Gebietes sind weitaus jünger als das Variszische Gebirge. Vor ca. 120 – 100 Mio. Jahren kollidierte die Afrikanische mit der Eurasischen Platte – die Alpenaufaltung begann, die heute noch nicht endgültig abgeschlossen ist. Die Fernwirkung der Plattenkollision reicht bis nach NRW. Vor allem in der höheren Oberkreide und im Tertiär führte sie zur Heraushebung der ostwestfälischen Mittelgebirge. Dabei wurden die Gesteine im Wesentlichen nicht verformt, sondern sie zerbrachen und wurden steil gestellt. Vor rund 250 000 – 200 000 Jahren überfuhren die Gletscher der Saale-Kaltzeit von Norden her das Weser- und Osnabrücker Bergland, das den Norden und Nordosten NRWs einnimmt, ist mit Teutoburger Wald, Eggegebirge, Weser- und Wiehengebirge eine landschaftlich und geologisch sehr abwechslungsreiche Region. Dafür spricht auch das bunte Bild, das die geologische Karte für dieses vor allem aus Gesteinen des Erdmittelalters aufgebaute Gebiet zeichnet. Das Erdmittelalter war eine Pha-

seiförmige Muldenstruktur. Das Eiszeitalter (Pleistozän) prägte die Landschaft entscheidend. Die heute an der Erdoberfläche weitverbreiteten Eis-, Fluss-, Schmelzwasser- und Windablagerungen stammen aus dieser Zeit. Das Kartenbild gibt die Verhältnisse gut wieder. So wird der zentrale Teil der Karte von den hellgrünen Farben der Oberkreide und denen der quartären Deckschichten dominiert.

Am südlichen Rand der Westfälischen Bucht liegt das **Ruhrgebiet**. Dieses ist kein geologisch-naturnäürlich, sondern ein wirtschaftsgeographisch definierter Raum. Geprägt ist er durch die steinkohleführenden Schichten des Oberkarbons. Im Übergangsbereich zum Rheinischen Schiefergebirge kommen diese bis an die Geländeoberfläche. Nach Norden werden sie von zunehmend mächtigeren kreidezeitlichen Meeresablagerungen überdeckt. Der einstmals blühende Steinkohlenbergbau und, darauf gründend, eine bedeutende Schwerindustrie haben dieser Region ihren unverwechselbaren Stempel aufgedrückt. So bestimmen im Ruhrgebiet häufig die von Menschen angelegten Abaumulden das Landschaftsbild.

Die heutige Gestalt erhielt das Niederhängebiet aber erst in der jüngeren Erdgeschichte, als es entlang von Verwerfungslinien verstärkt einsank. Es ist Teil eines Verwerfungssystems, das Europa von der Nordsee bis zum Rhonetal durchzieht. Dass die Bewegungen heute noch nicht abgeschlossen sind, wird durch Erdbeben immer wieder deutlich bewiesen. Die paläozoischen Gesteine im Untergrund dieses Raumes sind bis zu 1 000 m abtauknen. Darüber liegen Bereichsweise Festgesteine des Mesozoikums. Das Meer – die Ur-Nordsee – drang vor rund 30 Mio. Jahren bis nach Bonn vor. Die charakteristischen oberflächennahen Gesteine des Niederhängebietes sind die Lockergesteine des Tertiärs und des Quartärs.

Wichtigstes tertiärzeitliches Gestein ist die Braunkohle. Die riesigen Tagebaue, in denen sie gewonnen wird, sind landschaftsprägend. Im Quartär beeinflussen die Gletscher der Eiszeit den Raum nur randlich. Gestaltendes Element waren hier die Ströme Rhein und Maas, die mit ihrer Materialfracht die Gegend prägten.

500 Millionen Jahre Erdgeschichte

QUARTÄR
 Entwicklung und Verbreitung des Menschen

TERTIÄR
 Entwicklung der Säugetiere; erste Menschenartige (Hominiden) in Afrika

KREIDE
 erste bedecktsamige Blütenpflanzen; Riesensaurier und spätere Aussterben z. B. der Dinosaurier und Ammoniten

JURA
 erste Vögel

TRIAS
 erste primitive Säugetiere; Entfaltung der Großreptilien (Dinosaurier, Fischsaurier)

PERM
 Raub-Echsen mit säugetierähnlichem Gebiss; Aussterben der Trilobiten und anderer Arten

KARBON
 erste Reptilien, flugfähige Großinsekten (Riesenschabe); erste Nadelbäume

DEVON
 erste echte Fische, Riesenkrebse; Tiere und Pflanzen erobern Süßwasser und Festland

ALTPALÄOZOIKUM
 erste wirbellose Tiere im Meer (Kambrium); erste fischähnliche Wirbeltiere sowie erste Landpflanzen (Ordovizium und Silur)

Das Quartär ist das Zeitalter, in dem wir leben. Neben den natürlichen Prozessen ist es zunehmend der Mensch, der seine Umwelt verändert. Gesteine des Quartärs bauen den oberflächennahen Untergrund auf und sind daher von besonderer Bedeutung.

Zu Beginn des Tertiärs, das heute in die Systeme Paläogen und Neogen unterteilt wird, war NRW weitgehend Festland. Vom Nordrand des Sauerlandes bis nach NRW vor. In der Eothen-Kaltzeit, vor 400 000 Jahren, erreichten sie den Nordosten unseres Bundeslandes. In der Saale-Kaltzeit, vor 250 000 – 200 000 Jahren, breiteten sich bis zu 300 m dicke Eisschichten bis an den Rand des Rheinischen Schiefergebirges bzw. bis an den Niederrhein aus.

Die Gletscher nahmen Gesteine des Untergrundes auf und schiffen die damalige Landoberfläche glatt. Beim Abtauen hinterließen sie

Im weiteren Verlauf des Tertiärs drang das Meer teilweise aus dem Nordseeum nach Süden vor und überflutete das Niederhängebiet, das nördliche und westliche Münsterland sowie Teile des Weser- und Osnabrücker Berglandes. Bei seinem Vorstoß hinterließ das Meer

Die Kreide ist durch mehrere globale Großereignisse geprägt. Während der feuchtkühlen Unterkreide war NRW noch vorwiegend Festland. Dann kam es im Verlauf der Kreide weltweit sowohl zu einer Erwärmung als auch zu einschneidenden Veränderungen in der Konstellation der Kontinentalplatten. Dabei setzte einerseits die Entstehung großer Hochgebirge ein, z. B. der Alpen und des Himalajas, andererseits öffnete sich der Nordatlantik. Mit diesen Prozessen ging ein globaler Meeresspiegelanstieg einher. Das Meer konnte in NRW weit nach Süden vorstoßen. Lag zu Beginn der Unterkreide die Küstenlinie noch im nördlichen Münsterland, so verschob sie sich in der Oberkreide bis weit über die Ruhr hinweg nach Süden. Der infolge von Meeresspiegelschwankungen mehrfach vorrückende und zurückweichende Ozean hinterließ beim Vorstoß im nördlichen Küstenbereich Sande und Konglomerate, die dann von mehr als 2 000 m mächtigen Kalk-

Während des Juras war nur das Rheinische Schiefergebirge mit seinen Randbereichen Festland und unterlag bei mildem und zunehmend trockenem Klima der Verwitterung und dem Abtrag. Das übrige NRW wurde von einem Flachmeer eingenommen, das im Untertura (Lias) seine maximale Ausdehnung erreichte. Ab dem Mitteljura (Dogger) gliederten einsetzende Erdkrustenbewegungen den bis dahin recht einträuglichen Meeresraum in Becken und Schwellen. Aus dem Untertura stammen vorwiegend dunkle Ton- und Tonmergesteine. Im Mitteljura schalten sich darin

Das Zeitalter der Trias bekam seinen Namen aufgrund der Dreiteilung seiner Schichtenfolge in die Abschnitte Buntsandstein, Muschelkalk und Keuper. Der Obere Buntsandstein, der Muschelkalk und der oberste Keuper sind durch Meeresablagerungen geprägt. Die Gesteine der übrigen Abschnitte dokumentieren eine sich ständig verändernde Wüsten-, Seen- und Flusslandschaft mit zeitweise lagunären Bedingungen. Das Klima der Trias war subtropisch bis trockenwarm und wurde erst zum Ende hin kühler.

Das Perm war durch Hebung, Verwitterung und Abtragung des Variszischen Gebirges geprägt. NRW war im ersten Abschnitt des Perms, dem Rotliegend, ein Festland mit heißem, zunehmend trockenem Klima. Flüsse und Seen verschwanden, Wüsten breiteten sich aus. Unter diesen Bedingungen verwitterten die Gesteine von der Erdoberfläche aus teilweise bis in mehrere 100 m Tiefe in auffällig roten Farben. Gesteine des Rotliegend bestehen aus dem Abtragungsschutt des Variszischen Gebirges. Sie sind in NRW nur an wenigen Stellen oberflächennah zu finden. Im Untergrund sind sie vor allem im Weserbergland verbreitet.

Das Perm war durch Hebung, Verwitterung und Abtragung des Variszischen Gebirges geprägt. NRW war im ersten Abschnitt des Perms, dem Rotliegend, ein Festland mit heißem, zunehmend trockenem Klima. Flüsse und Seen verschwanden, Wüsten breiteten sich aus. Unter diesen Bedingungen verwitterten die Gesteine von der Erdoberfläche aus teilweise bis in mehrere 100 m Tiefe in auffällig roten Farben. Gesteine des Rotliegend bestehen aus dem Abtragungsschutt des Variszischen Gebirges. Sie sind in NRW nur an wenigen Stellen oberflächennah zu finden. Im Untergrund sind sie vor allem im Weserbergland verbreitet.

Das Karbon oder auch die Steinkohlen-Zeit verdankt ihren Namen den ausgedehnten Steinkohlelagern, die aus dieser Ära stammen. Zu Beginn des Karbons, im Unterkarbon, setzten sich zunächst noch die Ablagerungsbedingungen des Devons fort. Im Zuge der beginnenden Kollision des Gondwana-Kontinents mit dem Nordeuropäischen Kontinent stieg aber im südlichen Teil des heutigen Rheinischen Schiefergebirges schon das Variszische Gebirge auf. Dessen Abtragungsschutt wurde in das nördlich gelegene, sich langsam einengende Meeresbecken geschüttet. Im Vorland des auftauchenden Gebirges entstanden im Oberkarbon weite, flache, langsam absinkende Küstenlandschaften.

Das Karbon oder auch die Steinkohlen-Zeit verdankt ihren Namen den ausgedehnten Steinkohlelagern, die aus dieser Ära stammen. Zu Beginn des Karbons, im Unterkarbon, setzten sich zunächst noch die Ablagerungsbedingungen des Devons fort. Im Zuge der beginnenden Kollision des Gondwana-Kontinents mit dem Nordeuropäischen Kontinent stieg aber im südlichen Teil des heutigen Rheinischen Schiefergebirges schon das Variszische Gebirge auf. Dessen Abtragungsschutt wurde in das nördlich gelegene, sich langsam einengende Meeresbecken geschüttet. Im Vorland des auftauchenden Gebirges entstanden im Oberkarbon weite, flache, langsam absinkende Küstenlandschaften.

Gesteine des Devons sind in NRW weiträumig verbreitet. Aber nur im Rheinischen Schiefergebirge kommen sie unmittelbar an der Erdoberfläche vor. Als Folge der kaledonischen Faltung war im nördlichen Europa ein ausgedehntes Festland entstanden, das nach seinen roten Verwitterungsmassen als Old-Red-Kontinent bezeichnet wird. Dieser war Hauptlieferant der 5 000 – 8 000 m mächtigen Sedimente, die in das ihm südlich vorgelagerte Meeresbecken geschüttet wurden.

Schichten des Altpaläozoikums kommen an der Erdoberfläche nur an wenigen Stellen im Rheinischen Schiefergebirge vor; meist sind sie unter jüngeren Schichten verborgen. Linkshiesig treten Gesteine aus dem Zertältschnitt vom mittlern Kambrum bis zum Silur nur im Hohen Vern zu Tage. Rechtshiesig bilden Schichten aus Ordovizium und Silur den Kern zweier großer Sattelstrukturen bei Remscheid und im Ebbegebirge. Außerdem kommen sie in einzelnen Gesteinsschuppen bei Müsen im Siegerland vor.

ihre Gesteinsfracht in Form von Schmelzwassersedimenten und Moränen, die an den Eisrändern zu Wällen aufgeschoben wurden. Ein buntes Gemisch aller Gesteine, die das Eis auf seinem langen Weg von Skandinavien her aufgenommen hat, sowie Findlinge sind für die ehemals vereisten Gebiete typisch. Aber nicht nur diese Vorgänge prägen die Landschaft. Flüsse transportierten durch Frostverwitterung reichlich anfallenden Gesteinsschutt und lagerten ihn als Sand und Kies ab. Die spärliche Vegetation der Kaltzeiten schützte den Boden nicht vor kräftigen Winden, sodass Staub- und Sandpartikel weit transportiert und zu Löss, Sandlöss, Flugsand und Dünen aufgeweht wurden.

Die Lebewelt war den harten Umweltbedingungen angepasst. Kälteliebende Tiere wie Mammut und Wollnashorn durchstreiften (Kälte-)Steppen. Die ältesten Zeugnisse des Menschen in NRW sind 350 000 Jahre alte Steinwerkzeuge aus dem Raum Mönchengladbach.

Das Holozän ist im Grunde nur ein wärmelieblicher Klimabschnitt im Großjura der quartären Kalt- und Warmzeiten. Im Grundwasserbereich bilden sich vielerorts Torfe und ausgedehnte Moore. Ein wichtiger Faktor ist auch die Bodenbildung. Durch Verwitterung, Humusanreicherungen, Pflanzen, Bodenlebewesen und andere

Sande, Schluffe, Tone und Kiese, die sich im südlichen Niederhängebiet mit braunkohleführenden Ablagerungen verzahnen. Die Braunkohle entstand aus den abgestorbenen Pflanzen einer üppigen subtropischen Moorgevegetation, die die langsam absinkende Küstenregion des Niederhängebietes besiedelte. Aus den Pflanzenresten entwickelten sich mächtige Torfpartie, die unter jüngeren Gesteinsschichten entwässert und sich zu max. 100 m mächtigen Braunkohleflözen umbildeten. Diese werden derzeit noch in den Tagebauen des Rheinischen Braunkohlereviers abgebaut und im Wesentlichen zur Stromerzeugung genutzt. Verbunden mit dem Einsinken der Niederhängeischen Bucht kam es auch zu Vulkanausbrüchen. Die damals

Im global sehr warmen Klima der Oberkreide entwickelten sich die Lebewelt rasant. Zahlreiche neue Tier- und Pflanzengruppen tauchten auf, bei vielen, z. B. den Dinosauriern, kam es zum Reservenuchs. Gegen Ende der Kreide löschte eines der größten Massensterben der Erdgeschichte – wahrscheinlich infolge eines Meteoriteneinschlags – eine große Zahl an Tier- und Pflanzengruppen aus.

Kalk-, Schluff- und Sandsteine sowie Eisenerzflöze ein. Im Oberjura (Malm) wird die Gesteinsvielfalt durch die Bildung von Anhydrit-, Gips- und Salzgesteinen noch größer.

Gesteine des Juras sind im Weser- und Osnabrücker Bergland an der Erdoberfläche zu finden. Am Niederrhein und im nordöstlichen Münsterland sind sie bereichsweise im Untergrund verborgen.

Abwechslungsreich wie die Lebensräume und das Klima der Trias sind auch ihre Schichten. Es kommen bunte Sand-, Schluff-, Ton- und Kalksteine vor; unter lagunären Verhältnissen haben sich Gips- und Salzgesteine gebildet. Trias-Schichten sind sowohl im Weser- und Osnabrücker Bergland als auch am Eifelrand oberflächennah zu finden sowie im Untergrund des Niederhängebietes und des Westmünsterlandes.

Im zweiten Abschnitt des Perms, dem Zechstein, überflutete ein von Norden vordringendes Flachmeer mehrfach den Norden, den Nordosten und den Nordwesten unseres Landes. Der neue Ablagerungsraum war durch Senken und Schwellen gegliedert. Die Schwellen trennten seichte Meeresbereiche vom offenen Ozean ab. Durch starke Verdunstung im trockenheißen Klima würden die im Meerwasser gelösten Inhaltsstoffe so lange angereichert, bis sie in der Reihenfolge Karbonate – Sulfate – Chloride ausfielen. Neue Meeresvorstöße brachten frisches Wasser, der Abscheidungszyklus begann von Neuem. So entstanden zum Teil über

Diese wurden im feuchtwarmen Klima von einer üppigen Sumpflandvegetation besiedelt. Sie bestand aus zum Teil riesigen Farr-, Bärlapp- und Schachtelhalm-Gewächsen.

Die Sumpfwälder des Oberkarbons lieferten große Mengen an Biomasse, die sich in den langsam absinkenden Becken sammelte und zu Torf zersetzte. Dieser wurde immer wieder durch von Flüssen und Meer heranttransportierten Schlamm und Sand überlagert, durch die Auflast der jüngeren Gesteine entwässert und verdichtet. Mehrere hundert Male wiederholte sich dieser Vorgang. Im Laufe der Jahrmillionen bildeten sich durch die Erhöhung von

Neben Ton-, Schluff- und Sandsteinen sind Kalksteine ein charakteristisches Gestein vor allem des Mittel- und Oberdevons. Hier ist besonders der bis zu 1 000 m mächtige Massenkalk zu nennen. Er entstand aus riesigen Korallen- und Stromatoporenriffen, die im Laufe von Jahrmillionen in dem sauberen und tropisch-warmen Wasser des Devon-Meeres aufwuchsen. Der Massenkalk ist ein vielseitiger Rohstoff, beispielsweise für die Bau- und chemische Industrie, im Umweltschutz oder bei der Stahlerzeugung. So werden die sehr

Bei den altpaläozoischen Gesteinen handelt es sich um meist dunkle, bisweilen kalkhaltige Ton-, Schluff- und Sandsteine sowie um Quarzite. Sie wurden in einem Meeresbecken abgelagert, das von Großflutunien bis zum Baltikum und in Mittelefrankreich bis Böhmen reichte. Es herrschten damals gemäßigt warme Klimabedingungen.

Faktoren entwickeln sich verschiedene Böden, die Grundlage für Land- und Forstwirtschaft sind. Ab dem 5. vorchristlichen Jahrtausend sind Einwirkungen des Menschen auf die Umwelt bekannt. Die landwirtschaftliche Bodennutzung, der oft Waldrodungen vorausgegangen waren, begann. Flussregulierungen, flächenhafte Bebauung, Rohstoffgewinnung sowie die Beseitigung von Haushalts- und Industrieabfällen haben seitdem unsere Landschaft stark verändert. Und nicht nur das: Emissionen aus Verkehr, Energiegewinnung und Industrie führen zu einer globalen Klimaveränderung.

Quartäre Lockergesteine wie Kies, Sand oder Ton sind in ganz NRW zu finden. In den Flachlandbereichen, vor allem am Niederrhein und im Münsterland, sind sie oft mehr als 10 m, punktuell über 100 m mächtig. In den Mittelgebirgsregionen findet man sie als dünne, oft lückenhafte Decke. Sande und Kiese sind wichtige Rohstoffe und haben große Bedeutung für die Bauwirtschaft. Gleichzeitig sind sie aber auch unsere bedeutendsten Grundwasserspeicher.

Moorfächern sind wertvolle Lebensräume für seltene Tier- und Pflanzenarten und stehen heute unter Schutz. Sie sind wichtige Speicher für das Treibhausgas CO₂. Ihre weitere Zerstörung würde dieses freisetzen und damit negative Einflüsse auf das Klima verstärken.

Das Hauptverbreitungsgebiet von Kreide-Gesteinen in NRW ist die Westfälische Bucht, wo sie in den Randbereichen, vielerorts auch in ihrem Zentrum, bis an die Geländeoberfläche kommen. Weiterhin findet man Kreide-Schichten nördlich des Wiehengebirges und bei Aachen.

Die Kalk- und Mergelkalksteine der Oberkreide sind am Hellweg, im Münsterland und im Teutoburger Wald ein wichtiger Rohstoff – vor allem für die Kalk- und Zementindustrie. Sie werden z. B. in Beckum in riesigen Steinbrüchen abgebaut. Die Tonmergesteine finden als Ziegelrohstoff, die Sandsteine als Baustein Verwendung. Ein besonders begehrter Rohstoff für Feuerfestprodukte, für die Glas- und die chemische Industrie oder für die Fertigung von Solarmodulen, gleichzeitig aber auch ein wichtiges Grundwasserreservoir, sind die hochreinen Sande bei Haltern.

Ton- und Mergelsteine des Juras sind nach wie vor wichtige Rohstoffe für keramische Erzeugnisse. Sand- und Kalksteine werden heute kaum noch gewonnen. Eisenerze hatten ehemals eine wirtschaftliche Bedeutung. Heute ist das Bergwerk Wohlverhats-Nammen in Porta Westfalica die letzte Eisenerzgrube Deutschlands.

Vor allem harte Sand- und Kalksteine der Trias sind wichtige Steine- und Erden-Rohstoffe, z. B. für den Straßenbau. Die abgelaugten Sandgesteine verlieren vielen Heil- und Mineralwässern in Ostwestfalen ihren chemischen Charakter.

400 m mächtige Steinsalzlagerstätten an unterschiedlichen Standorten in NRW. Gesteine des Zechsteins, vor allem Karbonatgesteine, kommen nur bei Marsberg und Ibbenbüren oberflächennah vor. Im Untergrund sind sie am Niederrhein sowie im Weser- und Osnabrücker Bergland verbreitet. Zechstein-Steinsalz wird in Borth bei Wesel untertägig und bei Gronau durch Aussolung, z. B. für die chemische Industrie, gewonnen. Viele Heil- und Mineralwässer des Weser- und Osnabrücker Berglandes verdanken ihre Inhaltsstoffe den Salzen des Zechsteins.

Druck und Temperatur aus den Torfen Braunkohlen und schließlich Steinkohlen. Die 3 000 – 4 000 m mächtigen Schichten des flözführenden Oberkarbons enthalten rund 300 Steinkohleflöze, von denen etwa 50 mächtiger als 1 m sind.

Gesteine des Unterkarbons sind in der Eifel sowie am Nord- und Ostrand des Rheinischen Schiefergebirges zu finden. Gesteine aus dem Oberkarbon treten im Ruhrgebiet, im Aachener Raum und bei Ibbenbüren zu Tage. Die darin eingelagerten oberflächennahen Steinkohlen haben vor allem im Ruhrgebiet den einst blühenden Bergbau und eine bedeutende Schwerindustrie begründet.

reinen Kalksteine im Bergischen Land und im Sauerland in riesigen Steinbrüchen abgebaut. Außerdem sind sie im sonst grundwasserarmen Rheinischen Schiefergebirge wichtige Grundwasserreservoir.

Im Devon kam es auch zu untermeerischen Vulkanausbrüchen. Die ausfließende Lava erstarrte zu Diabasen, die man heute im Sauerland an vielen Stellen findet und die hochwertige Rohstoffe für den Verkehrswegebau sind.

Vor 450 – 420 Mio. Jahren wurden die Schichten von einer Gebirgsbildung erfasst, zusammengesoben und zum Kaledonischen Gebirge aufgefaltet. Wirtschaftlich spielen diese alten Gesteine heute keine Rolle mehr, auch wenn sie früher bisweilen in Ziegeleigruben und Steinbrüchen gewonnen wurden.

Verständliche Texte und eine Vielzahl von Abbildungen geben Einblicke in die Prozesse, die NRW und seine Landschaften mit ihren Gesteinen und Böden geprägt haben. Der Blick auf den Wert der Geoinformationen für die Gesellschaft vervollständigt die informative Lektüre.

Geologische Karte von Nordrhein-Westfalen 1: 500 000

Geologischer Dienst NRW

DER GEOLOGISCHE DIENST NRW

Wir sind die zentrale geowissenschaftliche Einrichtung des Landes Nordrhein-Westfalen und erforschen seit über 60 Jahren den Untergrund im gesamten Bundesland. Wir arbeiten fachübergreifend für die Sicherung eines gesunden Lebensraums und setzen uns für dessen nachhaltige Entwicklung ein. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erheben landesweit geowissenschaftliche Informationen, bereiten sie auf und machen sie für die Praxis nutzbar. Unsere Informationssysteme sind Grundlage für ein umfassendes Leistungsangebot mit den Themenfeldern Geologie, Boden, Gesteinsrohstoffe, Grundwasser, geophysikalische und geotechnische Untergrundeigenschaften, oberflächennahe und tiefe Geothermie sowie Endlagerung für radioaktive Abfälle. Wir ermitteln Daten zur Risikoversorge bei Gefahren, die vom Untergrund ausgehen, und betreiben das landesweite Erdbebenalarmsystem. Unsere Erkenntnisse stellen wir der Politik und Verwaltung, der Wirtschaft und den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung – analog und digital als Karten, Daten und Schriften. Viele dieser Informationen sind über Onlinedienste kostenfrei zugänglich.

Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen – Landesbetrieb – De-Greif-Str. 195 47803 Krefeld
 Telefon: 02151 897-0
 geoinfo@gd.nrw.de
 www.gd.nrw.de

Das Buch zur Erdgeschichte

Die Geschichte der Gesteine und Böden unseres Landes, ihre Bedeutung in der heutigen Zeit und in Zukunft.

GEOLOGIE UND BODEN IN NORDRHEIN-WESTFALEN

Diese Veröffentlichung des Geologischen Dienstes NRW erzählt die abwechslungsreiche Geschichte des Untergrundes, auf und mit dem wir jetzt und in Zukunft leben. Sie veranschaulicht die Bedeutung von Böden und Gesteinen für Grundwasser, Geothermie, Rohstoffe, Geofahren, für die Schönheit unserer Landschaft und für den Klimawandel.

Geologische Karte von Nordrhein-Westfalen

1:500 000

Auszug aus dem Informationssystem
Geologische Karte 1:500 000 (07/2018)
Topographische Grundlage: DTK 500-V (2002)
© Bundesamt für Kartographie und Geodäsie

© 2018 Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen
Landesbetrieb
De-Greif-Str. 195 · D-47803 Krefeld
Postfach 100763 · D-47707 Krefeld

Diese Karte ist gesetzlich geschützt. Vervielfältigung – auch auszugsweise – nur mit Erlaubnis des Herausgebers.
Als Vervielfältigung gelten zum Beispiel Nachdruck, Fotokopie, Mikroverfilmung, Digitalisierung, Scannen sowie Speicherung auf Datenträger.

ISBN 978-3-86029-974-6

Maßstab 1:500 000

- ▲— Auf-/Überschiebung
- ▲— Auf-/Überschiebung, unter Bedeckung
- ▲— Verwerfung (Abschiebung, Seitenverschiebung)
- ▲— Verwerfung (Abschiebung, Seitenverschiebung), unter Bedeckung
- ▲— Verwerfung (Abschiebung, Seitenverschiebung) in der niederrheinischen Bucht, im Quartär aktiv
- ▲— Verwerfung (allgemein)
- ▲— Verwerfung (allgemein), unter Bedeckung

KÄNOZOIKUM ERDNEUZEIT

- QUARTÄR**
Holozän
- 1 Künstliche Aufschüttungen
 - 2 Talablagerungen
Ton, Schluff, Sand, Torf
 - 3 Windablagerungen
Schluff, Sand
- Pleistozän
- 4 Niederterrassen
Sand, Kies
 - 5 Mittelterrassen
Sand, Kies
 - 6 Hauptterrassen
Sand, Kies
 - 7 Moränen
Schluff, Sand, Kies
 - 8 Schmelzwasserablagerungen
Schluff, Sand

TERTIÄR

- 2.6
- 9 Intermediäre bis basische Tuffe
Trachytuff, Phonolithuff (Tertiär, Quartär)
 - 10 Basische Ergussgesteine
Basalt (Tertiär, z. T. Quartär)
 - 11 Intermediäre Ergussgesteine
Trachyt, Latit (Tertiär)
- 66
- 12 Tertiär (ungegliedert)
Ton, Schluff, Sand, Kies, Braunkohle

MESOZOIKUM ERDMITTELALTER

- KREIDE**
- 13 Oberkreide (ungegliedert)
Mergelstein, Kalkstein, Sandmergelstein, Sand
 - 14 Campanium
Mergelstein, Kalkstein
 - 15 Mittelconiacium bis Santonium
Mergelstein, Sandmergelstein, Sand
 - 16 Cenomanium bis Unterconiacium
Kalkstein, Mergelstein, z. T. Grünsandstein
 - 17 Albium bis Cenomanium
Kalkstein, Mergelstein, z. T. Sandstein
 - 18 Valanginium bis Albium
Tonstein, z. T. Mergelstein, Sandstein
 - 19 Berriasium
Tonstein, Mergelstein, z. T. Sandstein
- 145
- JURA**
- 20 Jura (ungegliedert)
Tonstein, Mergelstein, Sandstein
 - 21 Oberjura (Malm)
Tonstein, Mergelstein, Kalkstein, Sandstein, z. T. Eisenerz
 - 22 Mitteljura (Dogger)
Tonstein, Mergelstein, Sandstein
 - 23 Unterjura (Lias)
Tonstein

- 201,5
- TRIAS**
- 24 Trias (ungegliedert)
Tonstein, Sandstein, Kalkstein
 - 25 Keuper
Tonstein, Mergelstein, z. T. mit Gips oder Anhydrit; Sandstein
 - 26 Muschelkalk
Mergelstein, z. T. mit Steinsalz, Gips oder Anhydrit; Kalkstein
 - 27 Buntsandstein
Tonstein, z. T. mit Steinsalz, Gips oder Anhydrit, Sandstein
- 252,5
- PERM**
- 28 Zechstein
Mergelstein, Kalkstein, Dolomitstein, Gips oder Anhydrit, z. T. Steinsalz
 - 29 Rotliegend
Sandstein, Konglomerat

PALÄOZOIKUM ERDALDERTUM

- 299
- KARBON**
- 30 Oberkarbon
Tonstein, Schluffstein, Sandstein, Steinkohle
 - 31 Unterkarbon
Tonstein, Kalkstein, z. T. Sandstein
- 361
- DEVON**
- 32 Basische Ergussgesteine
Diabas (Mitteldévon, Unterkarbon)
 - 33 Oberdevon
Tonstein, Sandstein, Kalkstein
 - 34 Mittel- bis Oberdevon
Riffkalkstein (Massenkalk)
 - 35 Mitteldevon
Tonstein, Schluffstein, Sandstein, z. T. Kalkstein
 - 36 Saure bis intermediäre Ergussgesteine
Keratophyr, Quarzkeratophyr (Unter- bis Mitteldevon)
 - 37 Unterdevon
Tonstein, Schluffstein, Sandstein

- 418
- ALTPALÄOZOIKUM**
KAMBRIUM BIS SILUR
- 38 Ordozium bis Silur
Tonstein, Schluffstein, Sandstein
 - 39 Saure Tiefengesteine
Tonalit (Ordozium)
 - 40 Kambrium
Tonstein, Sandstein, Quarzit
- Genannt sind nur vorherrschende und charakteristische Gesteine